

- Mantenga Descovy a temperatura ambiente y manténgalo alejado del calor excesivo y la humedad.

Guarde Descovy a una temperatura entre 68°F y 77°F (20°C a 25°C).

Deseche cualquier medicamento que esté vencido o que no se esté usando Pregúntele al farmacéuta cómo debe desechar el medicamento.

¿Qué debo hacer en caso de emergencia o sobredosis?

In case of overdose, call your local poison control center at 1-800-222-1222. If the person taking this medication collapses or is not breathing, call local emergency services at 911.

En caso de sobredosis, llame al centro local de envenenamiento al 1-800-122-1222.

Si la persona que está tomando el medicamento sufre un colapso o no está respirando, llame al servicio de emergencia local al 911.

¿Qué otra información necesito saber sobre Descovy?

- No permita que otra persona tome su medicamento.
- Si tiene alguna pregunta respecto a cómo volver a surtir la receta, hable con su farmacéuta.
- Haga una lista de todas sus recetas médicas y medicamentos de venta libre, así como de cualquier vitamina, mineral u otro suplemento dietético que esté tomando.
- Traiga la lista de medicamentos cada vez que consulte con el médico o si lo hospitalizan.

¿Qué debo hacer si dejo de tomar mi medicamento?

Si por alguna razón, deja de tomar Descovy, informe a su coordinador de PrEP en el centro de salud.

IMPORTANTE

La protección contra la infección por VIH comenzará a desaparecer entre 7 y 10 días después de dejar el PrEP.

Utilice métodos alternativos de prevención para reducir el riesgo de contagiarse VIH.

Los pacientes diagnosticados con hepatitis B deben controlarse de manera muy exhaustiva al dejar el PrEP.



COUNTY HEALTH
DEPARTMENTS

DEPARTAMENTOS DE SALUD DE LOS CONDADOS DE GWINNETT, ROCKDALE Y NEWTON PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL VIH

455 Grayson Hwy, Suite 500
Lawrenceville, GA 30056

Phillys Mwaura

Teléfono principal 770-339-4283 Ext. 420
Teléfono celular 770-633-5069
Fax 770-339-2345
phillys.mwaura@gnrhealth.com



www.gnrhealth.com



@GNRHD



@GNRHealth

20201229

PREVENCIÓN DEL VIH PrEP

Sólo una pastilla al día.



Descovy[®]
emtricitabine 200mg/
tenofovir alafenamide 25mg table
for **PrEP** pre-exposure prophylaxis

emtricitabina 200mg/alafenamida de tenofovir tabletas de 25mg para PrEP profilaxis previa a la exposición

Este es un paso importante para protegerse contra el VIH adquirido.

EL MEDICAMENTO QUE ESTARÁ TOMANDO PARA PREP ES:

MARCA

Descovy

Se pronuncia des KO vi

NOMBRE GÉNÉRICO

EMTRICITABINA Y ALAFENAMIDA DE TENOFOVIR



Descovy no es para todos.

Descovy no debe utilizarse en aquellas personas asignadas al sexo femenino al momento del nacimiento que tienen riesgo de adquirir VIH mediante el sexo vaginal. Su efectividad no ha sido estudiada en este grupo.

PREGUNTAS MÁS COMUNES

¿Qué es Descovy (PrEP)?

Descovy es un medicamento que se utiliza para prevenir la infección por VIH. Los médicos se refieren al uso de Descovy para prevenir la infección por VIH como profilaxis previa a la exposición o PrEP.

¿Cómo actúa Descovy para prevenir la infección por VIH?

El VIH es un virus que ataca las células inmunes del organismo, es decir, las células a cargo de combatir una infección.

Los dos compuestos que conforman Descovy, la emtricitabina y el tenofovir bloquean rutas importantes que los virus establecen al momento de la infección.

Los niveles de protección de Descovy PrEP tardan siete días en desarrollarse en el tejido anal y rectal.

Una vez que se ha tomado Descovy durante el tiempo necesario para lograr la protección, hay que continuar tomándolo diariamente, en lo posible a la misma hora todos los días, a fin de suministrar protección contra la infección por VIH.

¿Cómo debo tomar el medicamento?

- Tome un comprimido de Descovy por vía oral todos los días.
- Siga detalladamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase y ante cualquier duda, consulte con su médico o farmacéuta.
- Cuando se esté acabando el medicamento, comuníquese con su médico o farmacéuta para volver a surtir la receta.
- No deje de tomar Descovy sin antes consultar con su médico.

El riesgo de infección por VIH puede aumentar en caso de omitir una dosis o dejar de tomar Descovy todos los días.

¿Debo seguir una dieta especial mientras esté tomando PrEP?

Continúe con su dieta normal, salvo que el médico le indique lo contrario.

¿Qué debo hacer si olvidé tomar una dosis?

Si olvidó tomar una dosis de Descovy, tome la dosis tan pronto pueda.

Sin embargo, si ya es casi el momento de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con el programa normal de dosis.

No tome una dosis doble de Descovy para compensar la dosis olvidada.

¿Este medicamento tiene efectos secundarios?

Es posible que experimente ciertos efectos secundarios mientras esté tomando Descovy. Normalmente, los efectos secundarios desaparecen durante el primer mes de estar tomando el medicamento.

Los efectos secundarios más comunes incluyen:

- diarrea
- dolor de cabeza
- fatiga
- dolor estomacal

Avisé a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece.

Llame al médico de inmediato si tiene algún problema poco usual al tomar el medicamento o si tiene fiebre o escalofríos, especialmente, si están acompañados de dolor de garganta, tos, sarpullido u otros signos de infección.

¿Cómo debe guardar el medicamento?

- Descovy debe guardarse en el envase original, firmemente cerrado y fuera del alcance de los niños.